




ป่วยหัวอักแล้ว



เป็นไข้เกรน
หรือเปล่า ?





อาการที่พบของไมเกรน

- อาจปวดหัวข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้
- มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย
- อาจมีอาการน้ำมาก่อน เช่น ตาพร่าผึ้งแสง
- อาจรู้สึกไวต่อแสง เสียงหรือกลิ่นมากกว่าปกติ



ถ้ามีการเหล่านี้ครรไปพบแพทย์เพื่อรับ
การวินิจฉัยก่อนการใช้ยา
ไม่แนะนำให้ช่วยารับประทานเอง
เพราะหากใช้ยาไม่ถูกวิธี
อาจเกิดอันตรายได้



“ผอมเป็นหมอน”



ยาที่รักษาอาการปวดศีรษะ
ไมเกรน ได้แก่
Ergotamine





สิ่งที่ควรทราบก่อนใช้ยา Ergotamine



- ใช้เฉพาะเวลาปวดเท่านั้น
- ห้ามใช้ติดต่อ กันทุกวัน เพื่อป้องกันอาการปวดศีรษะ
ไมเกรนเด็ดขาด!!!
- รับประทานครึ่งแรก 1 หรือ 2 เม็ด ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง
- ห้ามรับประทานเกิน 6 เม็ดต่อวัน
- ห้าบรับประทานเกิน 10 เม็ดต่อสัปดาห์



การใช้ยาผิดวิธีอาจทำให้

- ความดันโลหิตสูงขึ้น
- เส้นเลือดในสมองแตก
- ปวดศีรษะอย่างมากเมื่อหยุดรับประทานยา
- ปลายมือปลายเท้า เย็นหรือชา
- ใจสั่น เจ็บหน้าอก



ผู้ที่ห้ามใช้ยานี้

- ✗ มีประวัติแพ้ยา Ergotamine หรือ อนุพันธ์ Ergor alkaloid
- ✗ มีประวัติหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
- ✗ มีความบกพร่องในการทำงานของตับ และไต
- ✗ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด



ไม่หมด ยังมีอีก

- ✗ ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
- ✗ ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
- ✗ หญิงตั้งครรภ์



มาตรฐาน衛生กัน

- ✓ พักผ่อนให้เพียงพอ
- ✓ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น
- ✓ ออกรกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ