



# เที่ยงทะเลสนุกๆ ไปกับ งานเดือนประจำเดือน






แต่่ม ๆ ๆ ๆ



อาทิตย์หน้าวันหยุดยาว



เราไปเที่ยวทะเลกันนะ...


จริง ๆ นะ...พูดแล้วนะ


ดีใจจังเลย



## 2 วันต่อมา...

แต่ก็มีอาการก่อนมีประจำเดือน






เจ้าต้องการซื้อยาอะไรจะหนูน้อย



หนุอยากได้ยาเลื่อนประจำเดือนค่ะ  
พอดีหนูจะไปเที่ยวทะเลอีกประมาณ  
3-4 วันนี่ค่ะ




# เจ้าจง กินอย่างน้อย 3 วัน

## ก่อนวันที่คิดว่าจะมีประจำเดือน



# และห้ามกินนานเกิน 2 สัปดาห์


อา. จ. อ. พ. พญ. ศ. ส.



ต้องกินครั้งละ 1 เม็ด


ส่วนจำนวนครั้งการกินต่อวัน

ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเจ้า






ถ้าเจ้าน้ำหนักตัว **น้อยกว่า 60 kg**  
ก็กินวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น)




ถ้าเจ้าน้ำหนักตัว **มากกว่า 60 kg**

ก็กินวันละ 3 ครั้ง (เช้า-กลางวัน-เย็น)



หากหยุดกินยา...

ประจำเดือนจะมาภายใน 2-3 วัน



# แต่เดี๋ยวก่อน...

ข้าขอตรวจดูก่อนว่าเจ้า

เป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้หรือไม่



# 1. สตรีตั้งครรภ์




## 2. กำลังให้นมลูก




### 3. มีปัจจัยเสี่ยงเป็น

## โรคหลอดเลือดอุดตัน





# 4. เคยเป็นโรคตับ หรือกำลังเป็นโรคตับขั้นรุนแรง





## 5. เคยเป็นหรือกำลังเป็นมะเร็งเต้านม



และจงจำไว้...


ทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ



# เจ้าอาการมีอาการ



เวียนศีรษะ



คัดตึงเต้านม



ประจำเดือน  
มาแบบกะปริบกะปรอย




ปวดหัว


ได้ยาแล้ว...ก็กินให้ถูกต้อง

ตามขนาดน้ำหนักตัวด้วยนะ



# 5 วันต่อมา...





ลืมกินยา...  
อดเล่นน้ำเลย

