



# วัคซีนป้องกัน โรคอีสุกอีส

## โรคอีสุกอีส

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส *Varicella zoster (VZV)*  
เกิดผื่นพุพอง เป็นตุ่มห้ามือการคัน  
และสามารถระจายไปยังผิวหนังบริเวณต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

ติดต่อได้จากการหายใจ ไอ จาม  
หรือสัมผัสกับตุ่มน้ำบริเวณผิวหนังโดยตรง

## อาการ



ปวดหัว ปวดเมื่อย มีไข้ เบื้องอาหาร ผื่นแดง  
หลังจากนั้นจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นทั่วร่างกาย

## วัคซีนโรคอีสุกอีส ควรฉีด 2 ครั้ง



### อายุน้อยกว่า 13 ปี

ฉีดเข็มแรก เมื่ออายุ 12-18 เดือน  
ฉีดเข็มที่สอง เมื่ออายุ 4-6 ปี

แต่หากช่วงนี้มีการระบาดของโรคอีสุกอีส เข็มที่สองอาจฉีดก่อนอายุ 4 ปี  
ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ แต่ต้องห่างจากครั้งแรกอย่างน้อย 3 เดือน

### อายุมากกว่า 13 ปี

ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน  
อย่างน้อย 4-8 สัปดาห์

ผลข้างเคียงที่พบ -> ไข้ ปวด บวม และ บริเวณที่ฉีดวัคซีน  
แต่หากมีอาการแพ้ยาแพ้วัคซีน เช่น มีผื่นคันขึ้นตามลำตัว ริมฝีปาก  
เปลือกตา หนังตา ใบหน้าบวม หายใจไม่สะดวก/หายใจลำบาก  
ควรรีบพบแพทย์ทันที



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
Food and Drug Administration



/FDATHAI