

ทาเล็บบ่อย เสี่ยงมะเร็งจริงหรือ ?



ตัวอย่างสารเคมีในน้ำยาทาเล็บ

ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)


- ช่วยให้น้ำยาทาเล็บแข็งตัว
- หากใช้บ่อยจะทำให้เล็บแห้งเปราะได้ง่ายขึ้น

(ความเข้มข้นไม่เกิน 5%)

โทลูอีน (Toluene)

- ช่วยให้น้ำยาทาเล็บมีผิวเรียบเมื่อทาลงบนเล็บ
- หากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อลำคอและปอดได้

(ความเข้มข้นไม่เกิน 25%)



สารข้างต้น มีความเกี่ยวข้องกับการก่อมะเร็งได้
(หากได้รับในปริมาณมาก)


แต่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากน้ำยาทาเล็บระเหยและแห้งเร็ว

วิธีการทาเล็บให้ถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายโดย

1. เลือกใช้น้ำยาทาเล็บที่มีการจดแจ้งกับ อย. แล้ว

2. เปิดหน้าต่างและประตูก่อนใช้น้ำยาทาเล็บ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

3. ไม่ควรใช้ปากเป่ายาทาเล็บให้แห้ง เป็นต้น



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

ผลิตโดย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

LINE@



/FDATHAI